

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

SMECTA powder for oral suspension in sachets
СМЕКТА прах за перорална суспензия в пликчета

1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

SMECTA

2. СЪСТАВ

Diosmectite* (DCF)	3.000 g
Monohydrated glucose	0.749 g
Sodium saccharin	0.007 g
Vanillin	0.004 g

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	
Приложение към разрешение за употреба № 11-5514/22.06.02	
621 / 28.05.02	Министър

За едно пликче с тегло 3.76 g

*Dioctahedralsmectite (1.4 nm phyllite):

Това е естествен двоен силикат на алуминий и магнезий, който се различава от другите силикати по своя спектър на дифракция на рентгеновите лъчи.

Желязото, магнезият и калцият частично заместват алуминия в октахедърния слой на алумоксида.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Прах за перорална суспензия

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

- Симптоматично лечение на болкови симптоми, свързани със заболявания на хранопровода, стомаха и дуоденума и на дебелото черво.
- Лечение на остра и хронична диария, особено при деца.

Лечението не изключва нуждата от рехидратация, когато се изисква. Обемът на рехидрата и начинът на въвеждане (перорално или интравенозно) се адаптира към възрастта и състоянието на пациента и тежестта на диарията.

4.2 ДОЗА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

При деца:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| • под 1 година | 1 пликче дневно |
| • между 1 и 2 години | 1 до 2 пликчета дневно |
| • над 2 години | 2 до 3 пликчета дневно |

Съдържанието на пликчето може да се разтвори в бутилка с 50 мл вода и да се дава през деня или да се смеси добре с полутечна храна: каша, задушени плодове, зеленчуково пюре и бебешка храна.

При възрастни:

Средно 3 пликчета дневно се разтварят в половин чаша вода.

На практика при остра диария дневната доза може да се удвои в началото на лечението.

За препоръчване е да се прилага:
- след хранене при езофагит
- между храненията при другите показания

При клизми: 1 до 3 клизми дневно с 1 до 3 пликчета, разтворени в 50 до 100 мл топла вода.

4.3 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не са известни

4.4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Няма

4.5 ЛЕКАРСТВЕНИ И ДРУГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Тъй като абсорбиращите свойства на този продукт могат да повлияят на скоростта и/или нивото на абсорбция на други вещества, препоръчва се да не се прилагат други лекарства едновременно със Смекта.

4.6 БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Няма

4.7 ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Няма

4.8 НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Съобщава се за много редки случаи на развитие или влошаване на запек: лечението е продължило след намаляване на дозата.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1 ФАРМАКОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА

Поради листната си структура и висок вискозитет Смекта притежава мощно свойство за обвиване на лигавицата на stomашно-чревния тракт.



Чрез взаимодействие с гликопротеините на слузта Смекта повишава резистентността на лигавичния гел в отговор на агресивни агенти.

Чрез действието си върху лигавичната бариера на стомашно-чревния тракт и поради високия свързващ капацитет Смекта защитава стомашно-чревната лигавица.

Смекта е прозрачна за рентгеновите лъчи, не оцветява фекалиите и в обичайни дози не променя физиологичното време на чревния пасаж.

5.2 ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ СВОЙСТВА

Няма

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1 НЕСЪВМЕСТИМОСТИ

Не са известни

6.2 СРОК НА ГОДНОСТ

4 години

6.3 СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Няма

6.4 ПРОИЗХОД И ЕСТЕСТВО НА ОПАКОВКАТА

319230.7: 3.760 г в пликчета (хартия, алуминий и полиетилен), по 30 в кутия

319231.3: 3.760 г в пликчета (хартия, алуминий и полиетилен), по 60 в кутия

6.5 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

няма.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Beaufour Ipsen International
37, rue Spontini
75116 Paris Cedex

8. ПРОИЗВОДИТЕЛ

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
rue Ethe Virton
28100 DREUX CEDEX (FRANCE)

9. ДАТА НА ПОСЛЕДНА РЕГИСТРАЦИЯ

